

子どもの予防接種

予防接種は、感染症などの病気に対し免疫を作って予防するためのものです。予防接種の効果と副反応を十分理解し、体調の良いときに受けましょう。また、以下の内容が今後変更となった場合は、広報小田原、市ホームページ等でお知らせします。

- 予診票は取扱医療機関にあります。**
- お子さん出生後の訪問時にお渡しする冊子「予防接種と子どもの健康」を必ず読んで、体調が良いときに受けましょう。
- 予防接種は、以下の対象年齢内であれば、10～11ページ記載の取扱医療機関で、市の費用負担（無料）で接種できます。**
取扱医療機関にあらかじめお問い合わせのうえ、**母子健康手帳を忘れずにお持ちください。**
- 里帰り出産などにより取扱医療機関での予防接種が難しい場合は、出産後速やかにご相談ください。

～**予防接種の計画を立てましょう**～ 期間中はいつでも接種できますが、それぞれの予防接種の目的から標準的な接種の年齢を■を目安として示してあります。

■：標準的な接種年齢 ■と■：法律で定められている対象年齢

| ワクチン名 | 年齢 | | 接種回数等 | | | |
|---------------------------------|---------------------------|---|---|-----------|-------|---|
| | 出生時 | 年齢 | | | | |
| B型肝炎 | 生後から | 1歳未満 | 3回接種 (1回目から27日以上あけて2回目、更に1回目から139日以上あけて3回目を接種) | | | |
| ロタウイルス感染症 | 生後6週0日後 | 24週0日後 | 2回接種 | | | |
| ロタテック (5価) | 生後6週0日後 | 32週0日後 | 3回接種 | | | |
| BCG (結核予防) | 生後から | 1歳未満 | 1回接種 | | | |
| 小児の肺炎球菌 | 生後2か月から | 5歳未満 | 標準的接種(生後2か月～7か月未満に接種開始)の場合 次のとおり4回接種 (初回接種(①②③):生後12か月までに27日以上の間隔を置いて3回接種 追加接種(④):初回の3回目終了後60日以上あけて生後12～15か月未満で1回接種) | | | |
| 五種混合 (ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ・Hib) | 生後2か月から | 7歳6か月未満 | 4回接種 (初回接種(①②③):20日～56日間隔で3回接種 追加接種(④):初回の3回目終了後6～18か月までの間隔をあけて1回接種) | | | |
| 四種混合 (ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ) | 生後2か月から | 7歳6か月未満 | 4回接種 (初回接種(①②③):20日～56日間隔で3回接種 追加接種(④):初回の3回目終了後12～18か月までの間隔をあけて1回接種) | | | |
| Hib (ヒブ) | 生後2か月から | 5歳未満 | 標準的接種(生後2か月～7か月未満に接種開始)の場合 次のとおり4回接種 (初回接種(①②③):27日～56日間の間隔で生後12か月未満の間に3回接種 追加接種(④):初回の3回目終了後、7～13か月までの間隔をあけて1回接種) | | | |
| 麻疹・風しん (はしか) | 1歳から | 2歳未満 | 各期1回接種 (第1期:1歳になったら早めに1回接種 第2期:小学校就学前の1年間(4月1日から3月31日まで)に1回接種) | | | |
| 水痘 (みずぼうそう) | 1歳から | 3歳未満 | 2回接種 【標準的な間隔】 (生後12か月～15か月未満で1回接種し、6～12か月までの間隔をあけて1回接種) | | | |
| 日本脳炎 | 平成23年4月2日以降の生まれのかた | 生後6か月から | 7歳6か月未満 | 9歳以上 | 13歳未満 | 4回接種 【標準的な間隔】 (1期初回(①②):6日～28日間隔で2回接種 1期追加(③):1期初回の2回目接種後、おおむね1年おいて1回接種 2期(④):9歳以上13歳未満で1回接種) |
| | 平成17年4月2日～平成19年4月1日生まれのかた | 平成17年4月2日～平成19年4月1日生まれの方は20歳未満までの間、4回接種のうち、不足回数を無料で接種できません。 | | | | |
| 二種混合 (ジフテリア・破傷風) | | | 11歳以上 | 13歳未満 | 1回接種 | |
| HPV (ヒトパピローウイルス) | 平成21年4月2日～平成26年4月1日生まれの女子 | | 小学6年生から | 高校1年生相当まで | ①②③ | シルガード9 【標準的な間隔】 初回接種 15歳未満:初回から6か月後に1回の計2回 初回接種 15歳以上:初回から2か月後に1回、初回から6か月後に1回の計3回 ※サーバリックス・ガーダシルについては市のホームページをご覧ください。 |
| | 平成9年4月2日～平成21年4月1日生まれの女性 | 令和4年4月～令和7年3月までの間に1回以上接種した方に限り3回接種のうち不足回数を無料で接種できます。 | | | | |

注：対象年齢の解釈 「～未満」は、「～の誕生日の前日まで」 例：「5歳未満」は「5歳の誕生日の前日まで」

ほかの予防接種との間隔のあけ方

- 十分な効果を得るために、注射生ワクチンを受けるときは、27日以上間隔をあけてください。
- 同じ種類のワクチンの接種を複数回受ける際は、ワクチンごとに決められた間隔を守ってください。

| | |
|---------|--|
| 注射生ワクチン | BCG、水痘(みずぼうそう)、麻疹、風しん、おたふくかぜ、麻疹風しん混合(MR) |
| 経口生ワクチン | ロタウイルス |
| 不活化ワクチン | B型肝炎、ヒブ、肺炎球菌、四種混合、五種混合、不活化ポリオ、日本脳炎、二種混合、HPV、インフルエンザ、三種混合 |

