

子どもの予防接種

予防接種は、感染症などの病気に対し免疫を作って予防するためのものです。予防接種の効果と副反応を十分理解し、体調の良いときに受けましょう。また、以下の内容が今後変更となった場合は、広報小田原、市ホームページ等でお知らせします。

■**予診票は取扱医療機関にあります。**

■**お子さん出生後の訪問時にお渡しする冊子「予防接種と子どもの健康」を必ず読んで、体調が良いときに受けましょう。**

■**予防接種は、以下の対象年齢内であれば、10～11ページ記載の取扱医療機関で、市の費用負担（無料）で接種できます。**

取扱医療機関にあらかじめお問い合わせのうえ、**母子健康手帳を忘れずにお持ちください。**

■**里帰り出産などにより取扱医療機関での予防接種が難しい場合は、出産後速やかにご相談ください。**

～予防接種の計画を立てましょう～

期間中はいつでも接種できますが、それぞれの予防接種の目的から標準的な接種の年齢を■を目安として示してあります。

■：標準的な接種年齢 ■と■：法律で定められている対象年齢

ワクチン名		年 齢	接種回数等
		出生時 2 か月 3 か月 4 か月 5 か月 6 か月 8 か月 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 6 歳 7 歳 8 か月 9 歳 10 歳 11 歳 12 歳 13 歳 14 歳 15 歳 16 歳 17 歳 18 歳 19 歳 20 歳 27 歳 28 歳	
B 型肝炎		生後から 1 歳未満 ■ 1 2 ■ 3	3 回接種 (1 回目から 27 日以上あけて 2 回目、更に 1 回目から 139 日以上あけて 3 回目を接種)
ロタウイルス感染症	ロタリックス (1 価)	生後 6 週 0 日後 24 週 0 日後 ■ 1 2 ■	※ワクチンは 2 種類あります。 途中からワクチンの種類を変更することはできませんので、2 回目以降は 1 回目と同じワクチンを接種します。 ※初回は、生後 14 週 6 日後までに接種します。 生後 15 週 0 日後以降の接種はお勧めしません。
	ロタテック (5 価)	生後 6 週 0 日後 32 週 0 日後 ■ 1 2 3 ■	
BCG (結核予防)		生後から 1 歳未満 ■ 1	1 回接種
小児の肺炎球菌		生後 2 か月から 5 歳未満 ■ 1 2 3 ■ 4	標準的接種(生後 2 か月～7 か月未満に接種開始)の場合 次のとおり 4 回接種 (初回接種(①②③):生後 12 か月までに 27 日以上の間隔を置いて 3 回接種 追加接種(④):初回の 3 回目終了後 60 日以上あけて 生後 12～15 か月未満で 1 回接種)
五種混合 (ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ・Hib)		生後 2 か月から 7 歳 6 か月未満 ■ 1 2 3 ■ 4	4 回接種 (初回接種(①②③):20 日～56 日間隔で 3 回接種 追加接種(④):初回の 3 回目終了後 6～18 か月までの間隔をあけて 1 回接種)
四種混合 (ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ)		生後 2 か月から 7 歳 6 か月未満 ■ 1 2 3 ■ 4	4 回接種 (初回接種(①②③):20 日～56 日間隔で 3 回接種 追加接種(④):初回の 3 回目終了後 12～18 か月までの間隔をあけて 1 回接種)
Hib (ヒブ)		生後 2 か月から 5 歳未満 ■ 1 2 3 ■ 4	標準的接種(生後 2 か月～7 か月未満に接種開始)の場合 次のとおり 4 回接種 (初回接種(①②③):27 日～56 日間隔で生後 12 か月未満の間に 3 回接種 追加接種(④):初回の 3 回目終了後、7～13 か月までの間隔をあけて 1 回接種)
麻しん・風しん (はしか)		1 歳から 2 歳未満 【1 期】■ 1 【2 期】■ 2 平成 31 年 4 月 2 日～令和 2 年 4 月 1 日生	各期 1 回接種 (第 1 期:1 歳になったら早めに 1 回接種 第 2 期:小学校就学前の 1 年間(4 月 1 日から 3 月 31 日まで)に 1 回接種)
水痘 (みずぼうそう)		1 歳から 3 歳未満 ■ 1 2	2 回接種 【標準的な間隔】 (生後 12 か月～15 か月未満で 1 回接種し、6～12 か月までの間隔をあけて 1 回接種)
日本脳炎	平成 23 年 4 月 2 日以後の生まれのかた	生後 6 か月から 7 歳 6 か月未満 9 歳以上 13 歳未満 【1 期】■ 1 2 3 【2 期】■ 4	4 回接種 【標準的な間隔】 (1 期初回(①②):6 日～28 日間隔で 2 回接種 1 期追加(③):1 期初回の 2 回目接種後、おおむね 1 年おいて 1 回接種 2 期(④):9 歳以上 13 歳未満で 1 回接種)
	平成 17 年 4 月 2 日～平成 19 年 4 月 1 日 生まれのかた	平成 17 年 4 月 2 日～平成 19 年 4 月 1 日 生まれの方は 20 歳未満までの間、4 回接種のうち、不足回数分を無料で接種できます。	
二種混合 (ジフテリア・破傷風)		11 歳以上 13 歳未満 ■ 1	1 回接種
HPV (ヒトパピローマウイルス感染症)	平成 21 年 4 月 2 日～平成 26 年 4 月 1 日 生まれの女子	小学 6 年生から 高校 1 年生相当まで ■ 1 2 3	シルガード 9 【標準的な間隔】 初回接種 15 歳未満:初回から 6 か月後に 1 回の計 2 回 初回接種 15 歳以上:初回から 2 か月後に 1 回、初回から 6 か月後に 1 回の計 3 回 ※サーバリックス・ガーダシルについては市のホームページをご覧ください。
	平成 9 年 4 月 2 日～平成 21 年 4 月 1 日 生まれの女性	令和 4 年 4 月～令和 7 年 3 月までの間に 1 回以上接種した方に限り 3 回接種のうち不足回数分を無料で接種できます。	

注:対象年齢の解釈 「～未満」は、「～の誕生日の前日まで」 例:「5 歳未満」は「5 歳の誕生日の前日まで」

ほかの予防接種との間隔のあけ方

■十分な効果を得るために、
注射生ワクチンを受けるときは、
27 日以上間隔をあけてください。

■同じ種類のワクチンの接種を複数回
受ける際は、ワクチンごとに決められ
た間隔を守ってください。

注射生 ワクチン	BCG、水痘(みずぼうそう)、麻しん、風しん、 おたふくかぜ、麻しん風しん混合(MR)
経口生 ワクチン	ロタウイルス
不活化 ワクチン	B 型肝炎、ヒブ、肺炎球菌、四種混合、五種混合、 不活化ポリオ、日本脳炎、二種混合、 HPV、インフルエンザ、三種混合

